






Document de référence : Planche pour identification de quelques microfossiles

A gauche la face ventrale et à droite la face dorsale.

<i>Neogloboquadrina pachyderma</i> Le test est compact et l'ouverture est décalée sur un quart. Cette espèce a deux variétés qui s'enroulent dans des directions opposées, chacune avec une distribution bien précise. Il faut placer la partie la plus bombée (la plus grande loge) vers le haut pour déterminer le sens d'enroulement		<i>Globigerina bulloides</i>
		
Senestre (enroulement gauche) : L'ouverture se trouve à droite Le test est très compact.	Dextre (enroulement droit) L'ouverture se trouve à gauche.	Les loges sont bien distinctes les unes des autres, rondes, en général au nombre de quatre lorsqu'on regarde par la face ventrale. L'ouverture est centrale, la plus grosse loge fait face à une autre loge, de l'autre côté de l'ouverture centrale.
Province arctique	Province subarctique	Province subarctique et tempérée

<i>Neogloboquadrina dutertrei</i>	<i>Globigerina ruber</i>	<i>Globorotalia menardii.</i>
		
Les loges sont nombreuses et détachées. L'ouverture est centrale	En général trois loges visibles sur la face ventrale. D'autres perforations sont présentes sur la face dorsale.	Test « festonné » ou caréné
Provinces subtropicale et tropicale	Provinces subtropicale et tropicale	Provinces subtropicale et tropicale